

IODOMED 10%®

IODOPOVIDONA

10 g / 100 ml

SOLUCIÓN

ANTISÉPTICO DESINFECTANTE

¿Qué contiene IODOMED 10%?

Cada 100 mililitros de solución contiene:
Iodopovidona 10 gramos.

Excipientes:

Fosfato trisódico dodecahidratado 0,75 g, Ácido fosfórico c.s.p. pH 5,5, Agua purificada c.s.p. 100 ml.

USO DEL MEDICAMENTO

**LEA CON CUIDADO ESTÁ INFORMACIÓN ANTES
USAR EL PRODUCTO. USO EXTERNO - NO INGERIR**

Acción: Antiséptico y desinfectante.

¿Para qué se usa IODOMED 10%?

IODOMED 10% solución se usa como desinfectante de la piel de uso general, pequeñas heridas, cortes superficiales y quemaduras leves.

¿Qué personas NO pueden utilizar IODOMED 10%?

No use este medicamento en las siguientes situaciones:

Alergia a la Iodopovidona.

Hipertiroidismo manifiesto.

Padece enfermedades del hígado o riñón.

Está siendo tratado con medicamentos que contienen litio.

Menores de 5 años.

No aplicar Iodopovidona antes de la radioterapia.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?

Deberá evitarse el uso simultáneo o sucesivo de otros antisépticos.

Posible interferencia en la exploración funcional de la tiroides durante la realización de estudios basados en la utilización del yodo radioactivo.

En caso de heridas profundas o quemaduras serias consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Durante el período de utilización del producto pueden aparecer los siguientes efectos adversos:

Irritación local, picazón, ardor. Si esto sucede suspenda el uso del producto, lavar con agua y consultar al médico

Medicamento de uso externo, exclusivamente sobre la piel y no debe ser ingerido. Evite el contacto con ojos, oídos y otras mucosas.

No debe utilizarse durante tiempo prolongado o en áreas muy grandes de la piel sin consultar al médico.

¿Cómo se usa IODOMED 10%?

Aplicar sobre la zona afectada, previamente higienizada, el producto puro, con una gasa.

Repetir la operación 3 a 4 veces al día.

Si la lesión no mejora o empeora en 48 hs, suspenda el uso del producto y consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días.

¿Qué debo hacer si use más cantidad de la necesaria o ingesta accidental?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de Toxicología:

Hospital General de Niños

"Dr. Ricardo Gutiérrez"

Tel.: (011) 4062 - 6666 / 2247

Hospital General de Niños

"Dr. Pedro de Elizalde"

Tel.: (011) 4300 - 2115 / 4362 - 6063

Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"

Tel.: (011) 4654 - 6648 / 4658 - 7777

Centro de Asistencia Toxicológica de La

Plata Tel.: (0221) 451 - 5555

¿Tiene usted alguna pregunta?

Su médico o farmacéutico le puede dar más información acerca de este medicamento o comuníquese con Medipharma S.A. al teléfono (0221) 450-2748 / 7267 o vía correo electrónico a contacto@medipharma.com.ar o bien llame al teléfono ANMAT responde 0800-333-1234.

Forma de conservación: Mantener por debajo de 30 °C. Una vez abierto el envase, el producto puede ser utilizado durante 6 meses.

Presentaciones: Envases plásticos con dosificador gotero conteniendo 40, 60, 100, 120, 200 y 250 ml.

Envases plásticos para uso hospitalario conteniendo 1, 5, 10 y 20 litros.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS
MEDICAMENTOS FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE
CUALQUIER DUDA CONSULTE CON
SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO**

Medicamento autorizado por el
Ministerio de Salud.

Certificado N°: 59.469

MEDIPHARMA S.A.

Dirección Técnica: M. Cristina Zuso
Farmacéutica.

Av. 143 N° 1435. La Plata, Provincia
de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 4502748 / 4507267

www.medipharma.com.ar

Elaborado en: Calle 23 esq. 66, Villa
Zagala (B1651CPC), San Martín,
Provincia de Buenos Aires.

Fecha de última revisión del prospecto
autorizado por la ANMAT: 10/06/2021

Venta Libre - Industria Argentina